

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM  
DU 21 JUILT AU 31 DÉCEMBRE 1920<sup>(1)</sup>,

PAR M. D. Bois.

Monocotylédones :

- |  |   |
|--|---|
| <i>Echnea bromeliæfolia</i> Baker,                                     | <i>Anthurium radicans</i> C. Koch et Haage, |
| — <i>calyculata</i> Baker,   | — <i>Waleuii</i> Regel;                     |
| — <i>Mariæ-Reginæ</i> H. Wendl.,                                       | <i>Asparagus tenuifolius</i> Lamk.;         |
| — <i>Weilbuchi</i> F. Didr.;   | <i>Billbergia Leopoldi</i> Lind.,           |
| <i>Aglaoonema versicolor</i> Hort.;                                    | — <i>Liboniuna</i> de Jongh.                |
| <i>Angræcum maxillarioides</i> Ridl.,                                  | — <i>Lietzei</i> E. Morr.,                  |
| — <i>Monolegi</i> Rolfe,   | — <i>macroalyx</i> Hook.,                   |
| — <i>Scottianum</i> Rehb. f.,  | — <i>Reichardii</i> Warra,                  |
| — <i>sesquipedale</i> Thou.,   | — <i>speciosa</i> Thunb.,                   |
| — <i>superbum</i> Thou.;   | — × ( <i>rosea</i> × <i>Saundersii</i> );   |
| <i>Anthurium Andreanum</i> Lind.,                                      | <i>Bowiea volubilis</i> Haw.;               |
| — <i>avaliefolium</i> Regel,   | <i>Bulbophyllum Careyanum</i> Spreng.,      |
| — <i>bellum</i> Schott.,   | var. <i>ochracea</i> Hook. f. (Guil-        |
| — × <i>carneum</i> Hort. ( <i>Andreanum</i><br>× <i>Lindenianum</i> ), | laumin det.) <sup>(2)</sup> ,               |
| — <i>coriaceum</i> G. Don.   | — <i>cuprenum</i> Lindl., id.,              |
| — <i>Duvivierianum</i> Hort. .   | — <i>lilacinum</i> Ridley,                  |
| — <i>emarginatum</i> Baker,  | — <i>Medusæ</i> Rehb. f.,                   |
| — <i>Laueanum</i> C. Koch.,  | — <i>papillosum</i> Finet,                  |
| — <i>magnificum</i> Linden,  | — <i>recurvum</i> Lindl.,                   |
|  | — <i>Watsonianum</i> Rehb. f.:              |

<sup>(1)</sup> Celles qui ont été énumérées dans les listes publiées de mars à juin 1920 et qui ont fleuri à nouveau depuis ne figurent pas dans celle-ci.

<sup>(2)</sup> Cette plante, dont la provenance exacte est inconnue, correspond à la description de Hooker (*Fl. Brit. Ind.*, VII, p. 188), mais non à sa planche (*Bot. Mag.*, t. 5316)= *B. Careyanum* Spreng., var. *ochracea* Hook.

Quant à la description de Lindley (*Bot. Reg.*, 1838, Misc. 95), elle est tout à fait insuffisante. Le scape et la fleur sont d'un jaune cuivré avec quelques lignes pourpres très fines sur les sépales et répandent une odeur désagréable. (GUILAUMIN.)

- Calathea grandifolia* Lindl.;  
*Cattleya Borreringiana* Veitch,  
— *labiata* Lindl., var. *autumnalis*;  
*Chamaedorea elegans* Mart.;  
*Chlorophytum amaniense* Engl.;  
*Cirrhopetalum Colletii* Hemsl.,  
— *picturatum* Lodd.;  
*Clivia nobilis* Lindl.;  
*Cyanotis kerensis* C. B. Clarke;  
*Cyperus Papyrus* L.;  
*Cypripedium*  $\times$  *Albertianum* J. Hye,  
—  $\times$  *Ashburtoniae* Hort.,  
— *barbatum* Lindl., v. *Crossii* Morr.,  
— — — v. *grandiflorum*,  
— *concolor* Batem., var. *Dayanum*,  
—  $\times$  *Crossianum* Rehb. f., var. *superbum*,  
—  $\times$  *Deedmanianum* (H. Poisson de-  
term.),  
—  $\times$  *Edgard Jolibois* (*insigne*, var.  
*Maullei*  $\times$  *barbatum*, var. *super-  
bum*),  
—  $\times$  *Evelyn* (*Calypso*  $\times$  *Leeanum*),  
— *Gibeziatum* Linden,  
— *insigne* Wall., var. *Maullei*,  
—  $\times$  *Lecanum* Rehb. f.,  
— — — var. *superbum*,  
—  $\times$  *OEdipe* (*Spicerianum*  $\times$  *Sallieri*,  
var. *Hyeanum*),  
— *philippinense* Rehb.,  
—  $\times$  *superclariæ* Hort.,  
— *vernixium* (*Argus* ♀  $\times$  *villosum*);  
*Dendrobium aggregatum* Roxb.,  
— *cymbidioides* Lindl.,  
— *fimbriatum* Hook., var. *oculatum*,
- Dendrobium Pierardi* Roxb.,  
— *prinulinum* Lindl.,  
— *superbum* Rehb. f., var. *Dayanum*,  
— — — — *Huttoni*;  
*Dichorizandra thyrsiflora* Mikan;  
*Dioscorea sinuata* Vel.,  
— *variifolia* Bert.;  
*Eichhornia crassipes* Solms;  
*Epidendrum ciliare* L.,  
— *inversum* Lindl.,  
— *radiatum* Lindl.;  
*Eucomis punctata* L'Hérit.;  
*Haemarthria coarctata* Haw.,  
— *subattenuata* Baker;  
*Hæmanthus albiflos* Jacq., var. *pu-  
bescens*;  
*Hæmaria discolor* Lindl., var. *Daw-  
soniana* Rolfe;  
*Hippeastrum equestre* Herb.;  
*Hymenocallis macrostethana* Baker;  
*Karatas Laurentii* Antoine,  
— *purpurea* Antoine;  
*Laelia crispa* Rehb. f.;  
*Læliocattleya Varjenewskyana* Linden :  
*Liparis longipes* Rehb. f.;  
*Liriopspicata* Lour.;  
*Listrostachys cephalotes* Rehb. f.  
(Guillaumin det.)<sup>(1)</sup>;  
*Maxillaria crassifolia* Rehb. f.,  
— *rufescens* Lindl.;  
*Miltonia spectabilis* Lindl.,  
— var. *bicolor* (Guillaumin det.);  
*Oncidium ampliatum* L.;  
*Oncidium ornithorhynchum* Kunth  
(Guillaumin det.),

<sup>(1)</sup> Détermination faite d'après la description; les fleurs sont blanc pur, à l'exception d'une tache verte sur le labelle comme chez le *L. Metteniae* Kränz. Rapporté de la Guinée française par Pobéguin en 1910, avait déjà fleuri en Angleterre en 1872 chez Wilson Saunders.

A la liste des *Listrostachys* cultivés donnée p. 574, ajouter *L. Gentilii* De Willd., *L. Kindtiana* De Willd. et *L. Pynaertii* De Willd., du Congo belge, qui ont fleuri dans les serres du Laeken, et le *L. Scheffleriana* Kränz., de l'Afrique orientale, qui a été cultivé au Jardin botanique de Berlin. (GUILLAUMIN.)

|   |   |
|---|---|
| <i>Oucidium pulvinatum</i> Lindl. ;         | <i>Polystachya laxiflora</i> L. ;       |
| <i>Ophiopogon Jaburan</i> Lodd. ,           | <i>Quesnelia rufa</i> Gaudich. ;        |
| — <i>japonicus</i> Ker-Gawl;                | <i>Sansevieria Kirkii</i> Baker,        |
| <i>Palisota Barterii</i> Hook. f. ;         | — <i>subspicata</i> Baker;              |
| <i>Pholidota imbricata</i> Lindl. ;         | <i>Spirautes picta</i> Lindl. ;         |
| <i>Pitcairnia acanthocalyx</i> Mart. (Guil- | <i>Tillandsia recurvata</i> L. ;        |
| laumin det.) ,                              | <i>Tradescantia Warseeviciana</i> Kunth |
| — <i>flavescens</i> Lindl. ,                | et Bouché;                              |
| — <i>Ruzli</i> E. Morr. :                   | <i>Trichopilia tortilis</i> Lindl. ;    |
| <i>Polystachya Caillei</i> Guillaumin (nov. | <i>Vriesea × Henrici</i> Hort-Duval.    |
| sp.) <sup>(1)</sup> .                       |   |

Dicotylédones :

|  |   |
|--|---|
| <i>Abutilon indicum</i> Sweet ,                | <i>Brexia madagascariensis</i> Thou. ;        |
| — <i>molle</i> Sweet ,                         | <i>Byrsinima lucida</i> DC. ;                 |
| — <i>Regnelli</i> Miq. :                       | <i>Camellia japonica</i> L. (var. diverses) ; |
| <i>Aceridocarpus zanzibanicus</i> A. Juss. :   | <i>Centradenia floribunda</i> Planch. ,       |
| <i>Agiphiella martinicensis</i> Jacq. ;        | — <i>grandifolia</i> Endlich. ;               |
| <i>Anisochilus pallidus</i> Wall. ;            | <i>Centropogon Warseevicii</i> Van Houtte ;   |
| <i>Antidesma Bunius</i> Spreng. :              | <i>Cereus (Echinopsis) Erygesii</i> Pfr. ,    |
| <i>Aphelandra tetragona</i> Nees :             | — <i>cærulescens</i> Salm Dyek ,              |
| <i>Ardisia huinilis</i> Vahl. ;                | — <i>Martini</i> Lab. ,                       |
| <i>Atalantia burserifolia</i> Oliv. ;          | — <i>peruviana</i> Mill. ,                    |
| <i>Baileya cristata</i> L. ,                   | — <i>rhololeucantha</i> Web. ;                |
| — <i>flava</i> Jacq. ;                         | <i>Ceropagia barbertonensis</i> N. E. Br. ,   |
| <i>Bertolonia marmorata</i> Naudin (B. ienea); | — <i>debilis</i> N. E. Br. ,                  |

(1) *Polystachya Caillei* Guillaumin nov. sp.:

*Pseudotulbi approximata*, *tenues*, *anguste fusiformes* ( $2,5 - 3 \times 0,3$  centim.), *griseo-tunicati*; *folia 3*, *inæqualia*, *linearia* ( $2,7 \times 0,2 - 0,3$  centim.) *apice rotundata*. *Scapi* 6 centim. *longi*, *racemosi*, *simplici*, *puberuli*; *bractæ setaceæ*, *glabrae*, *basi latiores*, 3 millim. *longi*; *flores albi*, *sepals marginibus tenuiter purpureis*, *glabris*; *pedicelli* 2 millim. *longi*; *sepallum dorsale ovatum*, *apice acutum*, 2 millim. *longum*, *lateralia obovata*, *lateraliter longe* (1 millim. 5) *acuminato-setacea*; *petala linearia*, 2 millim. *longa*; *labellum* in *S contortum*, 3 lobum, *lobis lateralibus auriculatis*, 1 millim. 5 *longis*, *mediano lanceolato*, *lateralibus æquilongo*, *mentum oblongo-saccatum*, *rix*, 1 millim. *longum*.

Guinée française (Caille); cultivé dans les serres du Muséum depuis 1913, y a fleuri en octobre 1920.

Espèce du groupe des *Setiferæ*, se rapproche surtout du *P. albo-violacea* Kränz., mais s'en distingue nettement : 1° par la forme des sépales latéraux; 2° par le labelle dont le lobe médian est seulement aussi long que les latéraux,

- |   |   |
|---|---|
| <i>Cevopgia Woodii</i> Schlechter;  | <i>Euphorbia balsamifera</i> Ait.,                  |
| <i>Cestrum Warscewiczi</i> Klotz;   | — <i>Echinus</i> Hook. f. et Coss.,                 |
| <i>Clerodendron disparifolium</i> Blume,                                      | — <i>globosa</i> Sims,                              |
| — <i>inerme</i> Gärtn.;   | — <i>mauritanica</i> L.,                            |
| <i>Clitoria tereta</i> L.;  | — <i>Regis-Jubae</i> W. et B.;                      |
| <i>Cocculus laurifolius</i> DC.;  | <i>Forestiera porulosa</i> Poir.;                   |
| <i>Colquhounia coerulea</i> Wall.;  | <i>Gelonium zanzibarensis</i> Muell. Arg.;          |
| <i>Colounea gloriosa</i> T. A. Sprague<br>(Guillaumin det.) <sup>(1)</sup> ,  | <i>Glorinia crassifolia</i> Hort.;                  |
| — <i>gloriosa</i> T. A. Sprague, v. <i>su-</i><br><i>perba</i> ;              | <i>Gatheca caulisflora</i> Nees;                    |
| <i>Cordia Aubleti</i> DC.;  | <i>Gomphocarpus fruticosus</i> R. Br.;              |
| <i>Correa speciosa</i> Ait., var. <i>Backhou-</i><br><i>siana</i> ;           | <i>Graptophyllum hortense</i> Nees;                 |
| <i>Cotyledon coccinea</i> Cav.,   | <i>Hibiscus Rosa-sinensis</i> L.;                   |
| — <i>Pachyphytum</i> Baker,   | <i>Hoya fraterna</i> Blume;                         |
| — <i>retusa</i> Baker;  | <i>Justicia furcata</i> Jacq.;                      |
| <i>Crassula Bolusii</i> Hook. f.,   | <i>Kleinia Autographinum</i> DC.;                   |
| — <i>lactea</i> Soland.;  | <i>Köhleria</i> (hybride);                          |
| <i>Cratoxylon Blancoi</i> Blume;  | <i>Ledebergia rosea-aenea</i> Lemaire;              |
| <i>Cudrania jaravensis</i> Tree.;   | <i>Litsæa japonica</i> Mirb.;                       |
| <i>Cyathula globulifera</i> Moq.;   | <i>Lycium chilense</i> Bertero;                     |
| <i>Dcherrainia smaragdina</i> Dene;   | <i>Malpighia glabra</i> L.,                         |
| <i>Dodonæa triquetra</i> Wendl.;  | — <i>Neumannii</i> A. Juss.,                        |
| <i>Dorstenia arifolia</i> Lamk. ( <i>D. cera-</i><br><i>tosanthes</i> Lodd.), | — <i>punicifolia</i> L.;                            |
| — <i>erecta</i> Vell.,  | <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.;                   |
| — — var. <i>hispida</i> Hook. f.  | <i>Marlea begoniæfolia</i> Roxb.;                   |
| (Guillaumin det.),  | <i>Medinilla venosa</i> Blume;                      |
| — <i>Massoni</i> Bur.,  | <i>Mesembryanthemum bulbosum</i> Haw.,              |
| — <i>nervosa</i> Desv.;   | — <i>crassifolium</i> L.,                           |
| <i>Elæodeudron ilicifolium</i> Tenore;  | — <i>Ecklonis</i> S. D.,                            |
| <i>Elatostema sessile</i> Forst.;   | — <i>incomptum</i> Haw.,                            |
| <i>Epiphyllum truncatum</i> Haw. var.<br><i>Wagneri</i> ;                     | — <i>purpureo-album</i> Haw.,                       |
| <i>Episcia cupreata</i> Hanst.;   | — <i>subincanum</i> Haw.;                           |
| <i>Eranthemum seticalyx</i> C. B. Clarke;                                     | <i>Mimosa acanthocarpa</i> Poir.;                   |
| <i>Erythrina coralloides</i> Moç. et Sessé;                                   | <i>Mitriostigma axillare</i> Hochst.;               |
| <i>Escallonia rubra</i> Pers.;  | <i>Moriunda citrifolia</i> L.;                      |
|   | <i>Myrtus communis</i> L., var. <i>leucocarpa</i> , |
|   | — <i>Luma</i> Barn.,                                |
|   | — <i>mucronata</i> Camb.;                           |
|   | <i>Nesæa myrtifolia</i> Desf.,                      |
|   | — <i>salicifolia</i> H. B. K.,                      |

<sup>(1)</sup> Plante à feuilles et poils verts. Une forme à poils rouges a été décrite et figurée par Sprague (*Bot. Mag.*, t. 8378), et la variété *superba* à poils et feuilles rouges, par Bois (*Rev. hort.*, 1915, p. 503, fig. 156 et planche coloriée).

- |   |  |
|---|--|
| <i>Nesaea syphilitica</i> Steud.;<br><i>Oreopanax floribundum</i> Dene et<br>Planch.,<br>— <i>Sanderianum</i> Hemsl.;<br><i>Parthenium argentatum</i> A. Gray (Gua-<br>yule, graines reçues de M. Da-<br>veau en 1920);<br><i>Peperomia argyreia</i> E. Morr.;<br><i>Petiveria alliacea</i> L.;<br><i>Phygellus capensis</i> E. Mey.;<br><i>Phyllanthus Emblica</i> L.,<br>— <i>grandifolius</i> L., var. <i>genuinus</i> ;<br><i>Phyllocactus carthagensis</i> A. Weber;<br><i>Picramnia Lindeniana</i> Tul. <sup>(1)</sup> ;<br><i>Pinguicula caudata</i> Schlecht;<br><i>Piper macrophyllum</i> H. B. K.;<br><i>Pithecellobium brevifolium</i> Benth.;<br><i>Plectranthus fruticosus</i> L'Hérit.;<br><i>Pratia begoniæfolia</i> Lindl.;<br><i>Psychotria undata</i> Jacq.;<br><i>Rhipsalis capilliformis</i> A. Weber,<br>— <i>Myosurus</i> Forst.;<br><i>Rhododendron crassum</i> Franch. (Bal-<br>four det.),<br>— <i>Fortunei</i> Lindl. (Guillaumin det.);<br><i>Rhus mucronata</i> Thunb.;<br><i>Rochea jasminea</i> D C.; | <i>Rochea perfoliata</i> D C.;<br><i>Rondeletia odorata</i> Jacq.;<br><i>Ruellia Dipteracanthus</i> Hemsl.;<br><i>Salvia involucrata</i> Cav.;<br><i>Sarcococca pruiniformis</i> Lindl.;<br><i>Saurauja pondiana</i> Wall.;<br><i>Sauvagesia albicans</i> Blume;<br><i>Schizogia coffeoides</i> H. Br.;<br><i>Securinega ramiflora</i> Muell. Arg.;<br><i>Sedum cristatum</i> Schrad.,<br>— <i>ebracteatum</i> Moç. et Sessé,<br>— <i>oxypetalum</i> H. B. K.;<br><i>Senecio tropaeolifolius</i> Mac Owan;<br><i>Sinningia coucinna</i> Nichols.:<br><i>Siphocampylus biserratus</i> A. D C.;<br><i>Solanum jasminoides</i> Paxt.,<br>— <i>torvum</i> Sw.;<br><i>Sparmannia africana</i> L.;<br><i>Sphaeralcea umbellata</i> G. Don;<br><i>Strobilanthes alatus</i> Blume;<br><i>Tinospora Bakis</i> Miers;<br><i>Trichilia elegans</i> A. Juss.;<br><i>Thunbergia grandiflora</i> Roxb., var.<br><i>alba</i> ;<br><i>Vernonia cinerea</i> Less.;<br><i>Viburnum suspensum</i> Lindl.;<br><i>Withania somnifera</i> Dun. |
|---|--|

<sup>(1)</sup> Par erreur dans une liste précédente, sous le nom de *Lindleyana*.